

Náhrada za Cloroxin (Endiaron) – CLIOQUINOL

Chemickou strukturou je tato látka totožná, rozdíl je v halogenech přítomných na heterocyklu - clioquinol zde má obsažený jod. Z toho plyne i případná nutnost konzultace záměny s lékařem, tato látka nebude zcela vhodná u pacientů alergických na jod. V pediatrii se nedoporučuje na velké plochy.

V zahraniční literatuře se používá do koncentrací 2 % (event. 3 %).

Clioquinol interaguje s klasickou zinkovou pastou a jsou i popsány inkompatibility s dvojmocnými ionty (předpokládám Zn, Ca). V nevodném prostředí jsou tyto interakce malé, ve vodném prostředí (např. tekutý pudr) budou probíhat více.

V přípravcích ZnOx zaměňujeme za Titan dioxid, případně Kaolin (Bolus alba).

V kombinacích se ZnOx, kde je potřeba ZnOx použít pro jeho terapeutický efekt používáme měkkou zinkovou pastu nebo 30% zinkovou hydrofobní masť (zdroj belgický receptář). Použitelnost zkracujeme na 1 event. 2 měsíce.

Jako další základy lze použít BasiFarm, Cremor neoaquasorb, Cutilan, případně masťový základ typu Synderman či Vazelína.